

# Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(Décembre 1887—Avril 1888)

18<sup>e</sup> Mémoire (1)

## COLÉOPTÈRES HÉTÉROMÈRES

Par L. FAIRMAIRE

Séance du 28 octobre 1891.

Parmi les Coléoptères recueillis au Venezuela par notre collègue et ami M. E. Simon, la grande division des Hétéromères compte un certain nombre de représentants, généralement d'assez petite taille, mais dont beaucoup constituent des espèces intéressantes et nouvelles. Il y a même un nouveau type générique voisin du genre *Charillus*, et qui compte plusieurs espèces.

La grande majorité de ces Insectes est spéciale à la région vénézuélienne; il s'y mêle quelques types de l'Amérique centrale et même du Brésil, mais ces derniers en très infime minorité.

Voici la liste des Hétéromères rapportés par M. E. Simon :

*Epitragus aurulentus* Kirsch : Caracas, Valencia, Puerto-Cabello. — *E. parumpunctatus*, n. sp. : Caracas, Colonia Tovar. — *E. angustiformis*, n. sp. : La Guayra. — *Zopherus chilensis* Gray : San-Esteban. — *Crypticus aterrimus* Champ. : Caracas. — *Chouspes Simonis*, n. sp. : San-Esteban. — *Diastolinus brevicollis*, n. sp. : Colonia Tovar. — *D. curtus* Muls. : Valencia. — *D. impressicollis*, n. sp. : San-Esteban. — *Opatrinus gemellatus* Ol. : Caracas, San-Esteban, La Guayra. — *Blupstinus opatrinoides*, n. sp. : La Guayra. — *B. curticollis*, n. sp. : Puerto-Cabello. — *B. piliferus*, n. sp. : Caracas. — *B. tenuestriatus*, n. sp. : San-Esteban. — *B. pseu-*

(1) Voir 15<sup>e</sup> mémoire (*Coléoptères-Lamellicornes*, par le Dr E. Candèze), Annales 1891, p. 329. On y trouvera la liste des quatorze autres mémoires qui précèdent. — 16<sup>e</sup> mémoire (*Arachnides : Chernetes [Pseudoscorpiones]*, par L. Balzan), Annales 1891, p. 497. — 17<sup>e</sup> mémoire (*Hyménoptères*, par Robert du Buysson et T. A. Marshall), Annales 1892, p. 53, pl. 3 et 4.

Ann. Soc. ent. Fr., 1892. — Juillet 1892.

*doxneus*, n. sp. : La Guayra. — *Trichoton curvipes* Champ. : Caracas. — *Calymmus cucullatus* Pasc. : Puerto-Cabello. — *Platydemia contractum*, n. sp. : San-Esteban. — *P. cruciatum* Chevr. : Colonia Tovar. — *P. guatemalense* Champ. : San-Esteban. — *Hoplocephala dytiscoides* Chev. : Colonia Tovar. — *Gnathocerus muxillosus* Fab. : Colonia Tovar. — *Allegora dilatata* Cast. : San-Esteban, Caracas. — *Uloma ferraginea* Say : Colonia Tovar. — *Ulosonia ceratodera*, n. sp. : Colonia Tovar. — *Molion Gondotii* Lac. : Colonia Tovar. — *Nyctobates cornuta*, n. sp. : San-Esteban. — *Zophobus opacus* Sahlb. : San-Esteban, Brésil. — *Phayllus minutus* Champ. : Colonia Tovar. — *Doliema plana* Fab. : Puerto-Cabello. — *Phymatodes denticollis* Lac. : San-Esteban. — *Rhynchodus*, n. g. — *R. asper*, n. sp. : San-Esteban, La Guayra. — *R. Simonis*, n. sp. : San-Esteban. — *R. parcegranatus*, n. sp. : Colonia Tovar. — *Anardus posticulis*, n. sp. : Colonia Tovar. — *Cyrtosoma oblongulum*, n. sp. : Colonia Tovar. — *C. impressipenne*, n. sp. : Colonia Tovar. — *Acropteron fustigatum* Makl. : Colonia Tovar. — *A. magnicolle*, n. sp. : San-Esteban. — *Pæcilesthus vagelineatus*, n. sp. : San-Esteban. — *Strongylium cyanicorne* Er. : San-Esteban. — *S. picicorne*, n. sp. : San-Esteban. — *S. erile* Makl. : San-Esteban. — *Talanus parallelus*, n. sp. : Caracas. — *T. crenulatus*, n. sp. : San-Esteban. — *Lobopoda pilosula*, n. sp. : San-Esteban. — *Dietopsis acuminata*, n. sp. : San-Esteban. — *Prostenus sennotatus* Chev. : La Guayra. — *Xystropus fascicularis* : Caracas. — *X. regularis*, n. sp. : Coroza. — *X. gossypiatu*, n. sp. : Caracas. — *Nilio Lebasii* Th. : San-Esteban. — *Stutira Simonis*, n. sp. : San-Esteban, Colonia Tovar. — *S. cylindricollis*, Makl. : San-Esteban, Caracas. — *S. variicollis*, n. sp. : Coroza. — *Buctrocerus cribripennis*, n. sp. : San-Esteban. — *Macratrria comosella*, n. sp. : San-Esteban. — *Tomoderus hirtulus* Laf. : San-Esteban. — *Leptaleus gibbircollis* Laf. : Valencia. — *Anthicus floralis* Fab. : Colonia Tovar. — *A. dromedarius* Laf. : Caracas. — *A. striatopunctatus* Laf. : Puerto-Cabello. — *Mordellistena tenuis*, n. sp. : Coroza. — *Rhipiphorus basicollis*, n. sp. : Caracas.

**Epitragus parumpunctatus.** — Long. 11 à 12 mill. — Oblongo-ellipticus, postice leviter attenuatus, modice convexus, picco-ænesceus, nitidus, glaber, elytris interdum magis picco-rufescentibus; capite sat dense sat subtiliter punctato, margine antico late rotundato et utrinque sinuato; antennis fuscis, apice crassioribus, medium prothoracis paulo superantibus; prothorace transverso, elytris angustiore, a basi antice attenuato, angulis anticis acutis, margine postico medio lobato, angulis

*rectis, dorso sat dense sat subtiliter punctato; scutello minuto, lœvi; elytris post medium attenuatis, apice acutiusculis, dorso subtiliter punctato-lineatis, intervallis fere lœvibus, vix perspicue, basi evidentius et irregulariter punctulatis; prosterno et metasterno fortiter, metapleuris subtiliter punctatis, abdomine subtiliter asperulo-punctato.* — Colonia Tovar.

Forme de *E. Chevrolati* Champ., mais distinct par la ponctuation des élytres à peine visible, celle des lignes ponctuées au contraire bien plus marquée et les angles antérieurs du corselet plus pointus, tandis que les postérieurs sont seulement droits.

**E. angustiformis.** — Long. 6 1/2 mill. — *Oblongus, convexus, postice vix attenuatus, piceo-metallescens, modice nitidus, subtilis cum pedibus magis piceus; capite dense sat fortiter punctato; antennis basi prothoracis fere attingentibus, articulis 3 ultimis latioribus; prothorace transverso, elytris vix angustiore, antice angustato, lateribus medio paulo ampliatis, leviter rotundatis, margine postico late bisinuito, angulis posticis fere rectis, margine antico fere recto, angulis paulo obtusis, dorso dense punctato, lateribus subtiliter marginato; scutello minuto, lœvi; elytris oblongo-elongatis, ad humeros rotundatis, postice leviter attenuatis, apice oblusis, dorso subtiliter substriato-punctatis, striis suturam versus, apice præsertim magis impressis, intervallis planis, punctulatis, postice obsolete rugosulis; subtilis punctatus, punctis squamigeris.* — La Guayra.

Remarquable par sa forme allongée, à peine atténuée en arrière, son corselet presque aussi large que les élytres, arrondi sur les côtés; les antennes ont les trois derniers articles plus courts et plus larges; le chaperon est largement arrondi au milieu, légèrement sinué de chaque côté.

**CRYPTICUS ATERRIMUS** Champ., Biol. Amer. Heterom., 137. — Long. 4 mill. — *Regularly ovate, convex, opaque, dull black. Head exceedingly finely and springly punctured; prothorax transverse, rounder at the sides, narrowing from the base, the surface (and that of the elytra also) apparently impunctate, dull and opaque; elytra the width of the prothorax at the base, rounded at the sides, narrowing from the base; legs piceous, the knees and tarsi sometimes reddish testaceous; antennæ piceous.*

Cette description convient à plusieurs individus trouvés à Caracas. L'espèce paraît répandue depuis Mexico et Panama jusqu'à Cayenne.

**Choaspes Simonis.** — Long. 8 à 9 mill. — *Ovatum*, postice valde convexum, fusco-nigrum, nitidum, elytris plus minusve cupreolis, intervallo 1<sup>o</sup> postice et 2<sup>o</sup> basi xneo-viridibus, margine externo et interdum lateribus viridi-zenescentibus; capite subtiliter parum dense punctulato, sutura clypeali utrinque impressa, medio obsoleta, antennis fuscis, nitidis, apice crassioribus, articulis 3 ultimis opacis, dense punctatis, 8<sup>o</sup>, 9<sup>o</sup>, 10<sup>o</sup>que transversis, 11<sup>o</sup> fere rotundato; prothorace valde transverso, lateribus antice leviter arcuatis, basi leviter sinuatis, angulis anticis late productis, apice obtusis, dorso fere lævi, disco impressiusculo, margine postico utrinque late sinuato, angulis fere acutis, margine laterali antice crasso, postice tenuiore; scutello triangulari, sat brevi, polito; elytris medio paulo ampliatis, apice obtusis, dorso modice punctulato-striatis, stria externa ante apicem abbreviata; prosterno paulo opaculo, inter coxas sat lato, bistriato apice obtuse angulato, mesosterno valde bifido, angulis valde productis, metasterno et abdomine valde nitidis, tibiis 4 anticis levissime arcuatis, femoribus posterioribus subtus medio leviter late angulatis et apice sinuatis. — San-Esteban.

Ressemble beaucoup à *C. purpureus* Champ., mais paraît plus gibbeux, les fémurs postérieurs sont seulement un peu angulés en dessous, et les élytres sont plus élargies en arrière, plus courtes, plus gibbeuses et plus irisées.

**Diastolinus brevicollis.** — Long. 5 1/2 à 7 mill. — *Oblongus*, sat convexus, parum nitidus, subsericeus; capite sat late, subtiliter dense punctato, antice integro, haud sensim sinuato, sutura clypeali transversim impressiuscula: palpis antennisque obscure ferrugineis, his basi gracilibus, articulis 6 ultimis crassioribus, ultimo majore, 3<sup>o</sup> quarto paulo longiore; prothorace brevi, longitudine duplo latiore, elytris angustiore, antice paulo angustato, lateribus a basi rotundatis, margine postico utrinque late sinuato, angulis posticis sat acutis, anticis parum obtusis, dorso medio lævi, lateribus punctulato; scutello triangulari, lævi; elytris sat subtiliter striatis, striis subtiliter punctatis, basi evidentius et suturam versus paulo magis impressis, intervallis fere planis, lævibus, suturam versus paulo convexiusculis, subtus lævis, tarsis piceis. — Colonia Tovar.

Cet Insecte ressemble assez à *D. curtus* Muls., de Curaçao; mais le corselet est moins large, moins fortement bisinué à sa base, les élytres sont bien moins striées et les stries sont faiblement ponctuées; les antennes sont plus longues et atteignent la base du corselet, les tibias sont droits.

**Diastolinus impressicollis.** — Long. 4 à 4 1/2 mill. — *Oblongus, parum convexus, fusco-niger, nitidus, elytris lateribus, præsertim ad humeros, picescentibus, antennis pedibusque piceis; capite dense subtiliter punctato, clypeo late leviter sinuato, labro producto; antennis crassiusculis, apicem versus paulo crassioribus, basin prothoracis paulo superantibus; prothorace valde transverso, brevi, elytris angustiore, lateribus antice leviter arcuatis postice fere rectis, angulis posticis rectis, dorso subtilissime dense punctulato, basi utrinque leviter sed evidenter impresso, angulis anticis valde obtusis, margine postico utrinque late leviter sinuato; elytris ad humeros sat rotundatis, sat fortiter striato-punctatis, striis basi fere crenatis, punctis dense seriatis, postice decrescentibus, intervallis convexiusculis, subtilissime vix perspicue punctulatis et subtilissime pubescentibus.* — San-Esteban.

Cet Insecte n'a guère le faciès ordinaire des *Diastolinus*, tant à cause de sa petite taille que de la sculpture effacée des élytres. Néanmoins, par *B. brevicollis*, il se rattache à *B. curtus* Muls. et aux autres petites espèces du genre.

**Blapstinus opatrinoides.** — Long. 7 mill. — *Oblongus, sat convexus, nigro-subcærulescens, modice nitidus, subtiliter ferrugineo-pubescentis; capite subtiliter dense punctulato, antice late leviter sinuato, utrinque valde rotundato; antennis piceis, sat gracilibus, apice paulo crassioribus, basin prothoracis haud attingentibus; prothorace transversim subquadrato, elytris angustiore, antice tantum paulo angustato, margine postico fortiter bisinuato, angulis posticis acutis, anticis parum obtusis, dorso subtiliter dense punctato, basi utrinque transversim vix impressiusculo; scutello subtilissime vix perspicue punctulato; elytris oblongis, apice rotundatis, sat fortiter striato-crenatis, intervallis sat convexis, subtilissime punctulatis, subtus dense punctulatus, pubescens, abdomine lateribus strigoso, tarsis piceis.* — La Guayra.

Ce *Blapstinus*, à cause de son corselet plus étroit que les élytres et fortement bisinué à la base, offre plutôt le faciès de certains *Opatrinus* d'Afrique que celui d'un *Blapstinus*, mais les yeux sont complètement divisés.

**Blapstinus pseudoæneus.** — Long. 4 mill. — *B. infimo sat affinis, sed minus parallelus, prothorace antice evidenter angustato, multo minus lato, elytris fortius ac densius punctatis, striis magis impressis, intervallis paulo magis pubescentibus et colore fusco leviter ænescente distinctus.* — Caracas, La Guayra.

Cette espèce ressemble à *B. metallicus* Fab., de l'Amérique du Nord, mais elle est moins métallique et les angles postérieurs du corselet sont bien moins pointus.

**Blapstinus piliferus.** — Long. 5 mill. — *Oblongus, convexiusculus, fuscus, parum nitidus, pilis ferrugineis adpressis vestitus; capite prothoraceque dense punctatis, illo antice rufescente et late leviter sinuato, antennis piceis apice dilutioribus; elytris subtilissime striatis, intervallis planis, subtiliter ruguloso-punctulatis; subtus opacus, prosterno lateribus rugosulo, pedibus rufo-piceis. B. nigroæneo affinis sed paulo angustior, capite minus angustato, prothorace antice vix sensim angustato, margine postico utrinque fortius sinuato, unde angulis paulo magis acutis, elytris multo subtilius striatis, striis haud sensim punctatis, intervallis magis planis et magis punctato-rugosulis.* — Caracas.

**B. infimus.** — Long. 3 mill. — *Oblongus, subparallelus, convexiusculus, niger, glaber, sat nitidus; capite sat lato, densissime punctulato, antice vix sensim sinuato; antennis nigro-fuscis, sat gracilibus, basin prothoracis haud attingentibus, articulis 3 ultimis majoribus, 8° præcedenti paulo majore, sed ultimis angustiore; prothorace transverso, antice et postice fere æqualiter angustato, lateribus levissime arcuatis, margine postico fere recto, angulis posticis obtuse rectis, anticis fere acutiusculis, dorso subtiliter densissime punctulato; elytris apice rotundatis, subtiliter striatis, striis subtiliter, intervallis subtilius punctatis.* — Valencia.

Remarquable par sa forme parallèle, le corselet n'étant pas sensiblement rétréci en avant, avec les côtés à peine arqués.

TRICHOTON CURVIPES Champ., Biol. Centr. Amer. Heterom, 136, pl. vi, fig. 25. — Long. 7 à 7 1/2 mill.

Ressemble beaucoup à *T. lapidicola* Champ. (que j'ai redécrit sous le même nom, Ann. Soc. Belg., 1889, B., p. 23), mais en diffère par la forme plus atténuée en arrière, les bords latéraux du corselet plus étroits, moins relevés, le bord postérieur moins fortement sinué de chaque côté et surtout par les tibias des mâles qui sont brusquement coudés en dedans à l'extrémité, les intermédiaires et les postérieurs étant seulement courbés à leur extrémité interne avec une étroite échancre.

Se trouve à Panama et au Brésil, et a été rencontré à Caracas par M. E. Simon.



CALYMNUS CUCULLATUS Pasc., var. *C. asperulus* Pasc. — Puerto-Cahello.

Un petit individu. se rapportant à *C. asperulus*, qui n'est qu'une variété de taille de *C. cucullatus*, comme le dit M. Champion.

On trouve au Venezuela une autre espèce :

**C. longedentatus.** — Long. 9 mill. — *Elongatus, convexus, fuscus, rubiginoso variegatus, tuberculis præsertim elytrorum rubiginosis; capite plano, leviter setuloso, tuberculis antennariis valde convexis; prothorace transverso, antice vix sensim angustiore, lateribus utrinque dentibus 6 sat longis armatis, antico longiore, sed oculum haud attingente, basali lato, truncato, dorso paulo inæquali, tuberculato, medio sulcato, antice cornuto, cornu sulcato, decumbente, apice dilatato et emarginato, tuberculato; scutello triangulari, fere nudo; elytris apice obtusis, subtiliter substriato-punctatis, intercallis vix convexiusculis, alternatim, basi præsertim, magis elevatis, inæqualibus granulatis et laxè tuberculatis, tuberculis densius setulosis; subtus cum pedibus subtiliter pubescens.* — Ma collection.

Ressemble un peu à *C. variegatus* Champ.; en diffère, ainsi que des autres espèces, par le corselet dont les denticulations sont longues et peu nombreuses, l'antérieure n'atteignant pas tout à fait les yeux.

PLATYDEMA GUATEMALENSE Champ., Biol. Centr. Amer. Heterom., 197, pl. VIII, fig. 21. — Long. 4 à 5 1/2 mill. — *Broad ovate, convex, dull reddish testaceous. Head shining, coarsely and closely punctured, the basal half piceous, the rest red, the epistoma defined by a shallow groove; antennæ with joints 7-10 strongly transverse, the four basal joints testaceous, the other slightly darker; maxillary palpi testaceous, the last joint broadly triangular; prothorax narrowing from the base, the sides feebly rounded, the anterior angles obtuse and almost rounded, the apex scarcely emarginate, the base strongly bisinuate, almost smooth, opaque, reddish testaceous, marked with black, thus: a broad irregular, subtriangular mark before the middle and a small transverse mark on each disc before the base, and on either side externally a crescent-shaped spot; scutellum triangular, red; elytra a little broader than the prothorax at the base, slightly rounded at the sides, regularly punctate-striate (the punctures shallowly impressed, fine and closely placed), the interstices smooth and almost flat, opaque, the entire surface about equally variegated with interrupted longitudinal black and sordid yellow streaks, the suture and margin and the epipleuræ reddish; legs reddish*

*testaceous, the tibiæ more or legs infuscate; beneath shining, reddish brown, the flanks of the prothorax testaceous.*

Cette espèce, décrite sur un seul individu provenant du Guatemala, a été recueillie en plusieurs individus par M. E. Simon à San-Esteban. La taille et la coloration sont assez variables, et, chez ces individus vénézuéliens, la teinte foncée est plus étendue et les taches fauves sont plus réduites.

**PLATYDEMA CRUCIATUM** Chev., Petit. Nouv. Ent., 1877, 129. — Long. 4 1/2 mill. — *Brevissime ovatum, convexum, nigro-fuscum, vix nitidulum, elytris utrinque plagis 2 magnis rubris, 1<sup>a</sup> subbasali, antice intus basin attingente et cum altera fere confusa, 2<sup>a</sup> majore, fere dimidiam partem posticam occupante; capite antice cum ore antennisque rufo; prothorace aut utrinque macula rubra ad latera rubra, aut tantum lateribus anguste rubro marginato, dorso haud punctato; scutello rubro; elytris subtilissime striatulis, haud punctatis; subtus aut rufum aut nigro fuscum, nitidum, pleuris et pedibus rufis.* — Colonia Tovar.

**Platydema contractum.** — Long. 4 1/2 mill. — *Brevissime elliptico-ovatum, nigro-fuscum, subopacum, convexum; capite fere lævi, antice rufescente et transversim impresso, antennis fuscis, basi et apicem versus rufo-piceis, articulo ultimo pallide ferrugineo; prothorace transverso, longitudine duplo latiore, antice valde angustato, margine postico utrinque late sinuato, angulis posticis paulo acutis. dorso lævi; scutello triangulari, lævi; elytris brevibus, medio ampliatis, postice valde declivibus, apice obtuse rotundatis, dorso sat fortiter striatis, striis subtiliter punctatis, intervallis fere planis, lævibus; subtus cum pedibus obscure ferrugineum.* — San-Esteban.

Ce *Platydema* est remarquable par sa forme courte et ramassée; il se rapproche de *P. antennatum* Cast., mais il est plus petit, plus court, les élytres sont assez fortement striées et les antennes n'ont que le dernier article pâle.

**HOPLOCEPHALA DYTISCOIDES** Chev., Petit. Nouv. Ent., 1877, 170. — Long. 7 mill. — *Oblongo-elliptica, valde convexa, piceo-fusca, valde nitida, polita, quasi vernicata, subtus cum pedibus antennisque magis rufopiceo; capite lævi, ♂ medio late et fortiter impresso, utrinque ad oculos cornu sat brevi, conico, crasso armato, clypeo antice sinuato et utrinque denticulo brevissimo munito, ♀ inermi, medio leviter impresso; antennis basin prothoracis attingentibus, apicem versus gradatim latioribus, subserratis; prothorace transverso, elytris haud angustiore, antice*



*paulo angustato, lateribus leviter arcuatis; scutello sat minuto, rotundato-triangulari; elytris subparallelis, apice rotundatis et sat fortiter declivibus, subtiliter lineato-punctulatis, punctis apice obsoletis; subtus fere lævis, prosterni lateribus dense ac subtiliter strigoso-punctatis.* — Colonia Tovar.

Cette espèce est remarquable par son corps lisse et vernissé, et par sa forme qui rappelle celle des *Evoplus*. Les deux cornes des mâles sont courtes et épaisses, et varient notablement de taille.

**ULOMA FERRUGINEA** Say. — Long. 9 à 10 mill. — *Oblonga, sat parallela, sat convexa, rufo-castanea, nitida; capite subtiliter punctato, antice impresso; antennis paulo dilutioribus, medium prothoracis haud attingentibus, articulis 6 ultimis transversis; prothorace transverso, elytris vix angustiore, antice paulo angustato, angulis omnibus sed anticis præsertim obtusis, dorso fere lævi, lateribus subtiliter marginato; scutello lævi, fere rotundato; elytris fortiter striato-punctatis, striis apice obsolescentibus, intervallis convexiusculis lævibus, apice planatis; subtus vix distincte punctulato, pedibus paulo dilutioribus; ♂ minor, capite supra oculos transversim sulcato, inter oculos leviter bituberoso, clypeo truncato, utrinque fortiter impresso, prothorace antice medio leviter impresso et evidentius punctato, tibiis anterioribus apicem versus latioribus, extus denticulatis; ♀ major, capite fortius punctato, inter oculos haud tuberoso, antice minus profunde arcuatim impresso, prothorace evidentius punctato antice haud impresso, tibiis anterioribus sat latis, basi constrictis, extus denticulatis, intus apice plus minusve rufo setosis, tibiis intermediis leviter arcuatis et extus denticulatis.* — Colonia Tovar.

Ressemble extrêmement à *U. ferruginea* Say, dont je ne connais que la femelle; mais cette dernière a les tibias intermédiaires bien plus fortement arqués et les postérieurs sont souvent arqués au lieu d'être droits; enfin, il me semble que chez *U. ferruginea* le corselet est plus arrondi sur les côtés en avant, avec les angles antérieurs plus obtus et que les élytres sont plus fortement striées.

Notre espèce est *U. fulva* du Catalogue de Dejean.

**Ulosonia ceratodera.** — Long. 6 mill. — *Oblonga, parallela, convexiuscula, fusco-picca, valde nitida, antennis pedibusque dilutioribus; ♂ capite lævi, clypeo antice cornu gracili obliquo, sat brevi, apice obtuso, fronte ad oculos utrinque denticulo sat acuto armato, antennis serrulatis, apicem versus leviter crassioribus; prothorace lævi, antice late arcuatim emarginato et utrinque cornu sat crasso, apice fere truncato,*

*marginè antico medio corniculo compresso, truncato, obliquo armato; elytris sat grosse punctato-striatis, striis et punctis postice et lateribus obsolescentibus, lateribus anguste marginatis; subtus magis piceus; ♀ capite inermi summo punctato, antice medio convexo et lævi, prothorace inermi, antice utrinque impressiusculo. — Colonia Tovar.*

Cette espèce est remarquable par l'armature de la tête et surtout du corselet. Elle s'éloigne un peu des autres *Ulosonia* par son corps moins déprimé et ses élytres moins fortement rebordées.

**NUPTIS CORNUTUS** Champ. — Long. 13 à 17 mill. — *Oblongus, convexus, niger, valde nitidus; capite summo lævi, inter oculos sat dense punctato, antice tenuius punctato et arcuatim impresso; antennis apice latioribus, articulis 5 penultimis transversis, ultimo brevissime ovato; prothorace transverso, lateribus ad angulos anticos valde rotundato, postice levissime attenuato, dorso convexo, lævi, margine postico utrinque lute sinuato, angulo postice paulo prominulis; scutello breviter ogivali; elytris basi rotundatis, ad humeros rotundatim angulatis, ante apicem leviter sinuatis, apice obtusis, dorso foveolis sat inæqualibus seriatis; subtus fere lævis, prosterno inter coxas sat lato, deplanato, lateribus crasse marginato, apice obtuso, metasterno late excavato, utrinque angulato, abdomine basi punctulato, pedibus sat validis, femoribus, anterioribus præsertim clavatis; ♂ clypeo ad marginem anticum dente sat parvo armato, prothorace postice magis attenuato, dorso haud foveato, tibiis anterioribus medio dente armatis; ♀ clypeo inermi, prothorace postice minus attenuato, disco sat fortiter bifoveato, tibiis anticis inermibus. — ♀. San-Esteban; se trouve aussi en Colombie, au Guatemala et au Brésil.*

Voisin de *N. variolosus*; le mâle se distingue facilement par la dent du chaperon et des tibias antérieurs; la femelle diffère par le corselet plus large, bien plus arrondi aux angles antérieurs, par les fossettes des élytres moins grandes et par les pattes plus courtes avec les fémurs claviformes.

**Phymatodes denticollis.** — Long. 12 à 14 mill. — *Oblongus, postice plus minusve ampliatus, convexus, nigro-fuscus, submetallescens, nitidus, interdum paulo æruginosus; capite inæquali, parce laxè punctato, antice late fere triangulariter impresso, antennis crassis, opacis, articulo 1° excepto; prothorace elytris valde angustiore, valde transverso, lateribus postice leviter sinuatis, antice biangulatis, angulo antico fere dentiformi, dorso inæquali, grosse parum dense punctato, basi medio,*

*antice et lateribus leviter foveolato; scutello rarius punctato; elytris grosse subseriatim tuberculatis, tuberculis parum regularibus, intervallis grosse parum dense punctatis, inæqualibus; subtus fere lævis pectore lateribus grosse punctato; ♂ minor et angustior, femoribus 2 anticis ante apicem subtilus sat fortiter angulatis, tibiis basi constrictis, femoribus intermediis ante apicem leviter utrinque dentatis, tibiis 4 posticis apice intus paulo arcuatis; ♀ major, postice magis ampliata, femoribus obsolete angulatis. — Caracas, San-Esteban.*

Ressemble beaucoup à *P. exsculptus* Perty, mais le corselet est très différent avec ses angles antérieurs pointus.

Chez les *Phymatodes*, les antennes sont presque cylindriques et médiocrement épaisses; chez l'espèce suivante, elles sont épaisses et claviformes.

**P. clavicornis.** — Long. 17 mill. — Forme et coloration du *P. denticollis*, mais plus grand, avec les élytres moins convexes, un peu moins déclives à l'extrémité; le corselet est plus nettement rebordé; les angles antérieurs sont très obtus, le disque présente de gros points peu serrés, une forte impression transversale en avant, un sillon médian élargi en avant, effacé en arrière, de chaque côté une forte impression ovale, transversale; l'écusson est uni, presque lisse; enfin, les antennes sont courtes, épaisses, un peu élargies vers l'extrémité, les articles transversaux, le dernier oblong, aussi long que les deux précédents réunis, les premiers un peu plus minces. — Buenos-Ayres.

### **Rhichnodus, n. g.**

Ce nouveau genre pourrait être pris, au premier abord, pour le genre *Chætyllus* Pasc.; mais il en diffère notablement par le pénultième article des tarses non dilaté ni bilobé; ce même caractère le distingue des *Phobelius* dont il diffère, en outre, par les élytres très convexes, à épaules effacées, les palpes maxillaires très grêles avec le dernier article en triangle renversé et le corselet rétréci en avant avec les angles antérieurs arrondis. La forme de la tête brusquement rétrécie à la base, jointe à celle du corselet, fait ressembler ces Insectes à de gros *Anthicus* ou plutôt à des *Mastigus* courts et renflés.

**R. asper.** — Long. 4 à 6 mill. — *Oblongus, elytris ovatis, valde convexus, nigro-fuscus, modice nitidus, pilis fuscis hirsutus; capite postice quadrato, antice fere rotundato, coriaceis, granulis parum dense asperato, postice utrinque paulo oblique sulcatulo, antennis basi et apice*

*rufo-testaceis, sat validis, apicem versus crassioribus, articulis penultimis transversis; prothorace elytris multo angustiore, cordato, postice valde angustato, lateribus antice angulatim rotundatis, margine antico vix arcuato, dorso coriaceo, granulis parum dense asperato; elytris ovatis, medio ampliatis, obtuse acuminatis, late striatis, striis grosse punctatis, subtiliter granulatis, intervallis angustis convexis, interruptis, fere granulatis, rugosis, lateribus evidentius punctato-striatis, minus rugosis; tarsis rufo-testaceis.* — San-Esteban, La Guayra.

Les antennes ont parfois le dernier article seul testacé.

**R. Simonis.** — Long. 3 à 3 1/2 mill. — *Statura præcedentis, sed multo minor, fuscus, parum nitidus, elytris basi et fasciis duabus transversis fulvis, valde dentatis, 1<sup>a</sup> ante, 2<sup>a</sup> post medium, tibiis, tarsis, femoribus basi, palpis antennarumque basi et apice fulvo-testaceis; capite postice quadrato, antice obtuso, valde rugato-punctato, utrinque leviter striato; prothorace subcordato, postice valde angustato, lateribus antice valde rotundatis, dorso valde rugoso-punctato, medio linea paulo elevata signato; elytris ovatis, apice obtuse acuminatis, basi et postice valde angustatis, grosse striato-punctatis, intervallis convexis hirsutis.* — San-Esteban.

Remarquable par la coloration des élytres présentant des bandes fauves formées de lignes plus ou moins accolées.

**R. parcegranatus.** — Long. 3 1/2 à 4 1/2 mill. — *Præcedentibus affinis, sed elytris brevioribus latioribus, gibbosis; piceus, nitidus, elytris piceis, subtiliter rubiginoso-pubescentibus. labro, palpis antennarumque basi et articulo ultimo testaceis, palpis maxillaribus interdum articulo ultimo brunneo; capite rugato-punctato, medio breviter carinulato, post oculos oblique sulcato; prothorace brevissime ovato lateribus rotundato, dense punctato; elytris medio prothorace tripto latioribus, apice obtusis, sat fortiter substriato-punctatis, intervallis alternis vix convexioribus, tuberculis fuscis luce signatis, his tuberculis breviter hispidis; pedibus rufo-piceis, femoribus tibiisque apice infuscatis.* — Colonia Tovar.

Remarquable par ses élytres courtes, larges et gibbeuses, à fine pubescence ferrugineuse et à tubercules noirs, écartés, surmontés d'une courte soie, sur les intervalles alternes.

**R. striatopunctatus.** — Long. 4 mill. — *Statura præcedentium sed minus convexus; fuscus, nitidus, pallide villosus, antennis pedibusque piceis; capite fortiter punctato, antennis articulo ultimo*

*pallido*; *prothorace punctato, subcordato, minus convexo*; *elytris ovatis, sat convexis sed dorso leviter planiusculis, substriato-punctatis, punctis grossis, intervallis paulo convexis*; *subtus piceus, fere lævis*. — Colombie (ma collection).

**Anædus posticalis.** — Long. 4 mill. — *Oblongus, parum convexus, castaneo-brunneus, valde nitidus, elytris basi et extus paulo rufescentibus, macula externa post medium et plaga apicali antice producta, ad marginem dilatata ferrugineis*; *capite fortiter punctato, antice impresso, tuberculis antennariis elevatis, nitidis*; *antennis sat crassis, medium corporis attingentibus, piceis, apice dilutioribus*; *prothorace elytris angustiore, longitudine duplo lutiore, lateribus dilatatis, rotundato-angulatis, dorso medio punctato, lateribus fere lævi, lateribus et basi marginato, angulis posticis acutis*; *scutello obtuso, fere lævi*; *elytris ad humeros parum rotundatis, fortiter punctato-striatis, punctis grossis et basi irregularibus, intervallis sat convexis, lævibus*; *pedibus ferrugineis*. — Colonia Tovar.

Ressemble beaucoup aux *A. mexicanus* et *marginatus* Champ., mais en diffère par la forme plus étroite, les angles postérieurs du corselet moins épieux et les élytres striées, à taches apicales bien marquées.

**Cyrtosoma oblongulum.** — Long. 11 mill. — *Oblongum, sat convexum, postice vix ampliatus, nigro-fuscum, nitidum, capite prothoraceque paulo cærulescentibus*; *capite parce subtilissime punctulato, antice fere truncato, angulis rotundatis, antennis basin prothoracis attingentibus, gracilibus, articulis 5 ultimis gradatim lutiore, ultimo majore, brevissime ovato*; *prothorace elytris angustiore, longitudine duplo latiore, lateribus rectis, parallelis, integris, ad angulos anticos rotundatis, marginatis, basi utrinque marginata et utrinque late sinuata, angulis acute rectis, dorso lævi, paulo inæquali, medio subtiliter sulcato, sulco medio magis impresso, utrinque medio et postice impressiusculo*; *scutello subtriangulati, lateribus arcuatis*; *elytris ad humeros sat rotundatis, post medium leviter ampliatis, dorso fortiter striatis, striis postice profundioribus, fortiter punctatis, sed punctis distantibus et posticis magis impressis, crenulatis, intervallis lævibus, convexis*; *subtus fere lævis, prosternum inter coxas bisulcato, tibiis 4 posticis levissime arcuatis, tarsis subtus dense fulvo-villosis*. — Colonia Tovar.

La forme oblongue de cet Insecte, jointe aux côtés du corselet droits, entiers, et aux antennes grêles, le différencie de ses congénères.

**Cyrtosoma impressipenne.** — Long. 8 mill. — *Oblongum,*



*postice vix ampliatum, convexum, fuscum, modice nitidum; capite sat lato, antice vix arcuato, utrinque rotundato, haud perspicue punctato, sutura clypeali sat impressa, medio recta, utrinque obliqua; antennis basin prothoracis vix superantibus, sat gracilibus, apice parum crassioribus, articulo ultimo majore, fere globoso piceis, articulis 5 ultimis ferrugineis; prothorace elytris angustiore, transverso, antice vix sensim angustato, lateribus marginatis, fere rectis, medio obsoletissime obtuse angulatis, dorso indistincte punctulato, basi subtiliter marginato et medio foveolato, utrinque sat fortiter sinuato, angulis posticis rectis, anticis productis; scutello triangulari, sat acuto; elytris ad humeros angulatim rotundatis, apice obtuse rotundatis, dorso sat subtiliter striatis, sed striis punctis oblongis parum densatis impressis, intervallis planis, transversim levissime, postice evidentius undulatis; subtilus cum pedibus piceum, leviter æneo tinctum, prosterno inter coxas bisulcato. — Colonia Tovar.*

Cet Insecte s'éloigne assez des vrais *Cyrtosoma* à élytres assez courtes et presque gibbeuses, et se rapproche davantage des *Epicalla*. Mais, chez ces derniers, les yeux sont assez rapprochés et, ici, ils sont très écartés. La forme du corselet, à angles antérieurs saillants, est assez caractéristique.

On trouve au Brésil une autre espèce, *C. cribricolle*, qui ressemble tout à fait à notre Insecte, même forme, même coloration, même sculpture des élytres; seulement, les points des stries sont plus enfoncés, les ondulations sont un peu plus marquées, et le corselet est densément ponctué, presque striolé, avec les côtés faiblement sinués avant les angles postérieurs qui sont très pointus; enfin, la tête est ponctué, tronquée en avant avec les saillies antennaires très prononcées; les métapleures et les propleures sont très ponctuées, tandis qu'elles sont lisses chez la première espèce.

**Acropteron magnicolle.** — Long. 12 à 13 mill. — *Elongatum, postice attenuatum, apice acuminatum, æneum, nitidum; capite lato, dense punctato, antennis fuscis; prothorace transversim quadrato, longitudine dimidio latiore, angulis posticis acutis, retroversis, dorso fortiter dense punctato, postice impressione arcuata signato, margine postico elevato, polito, utrinque foveola minuta signato; scutello lævi; elytris elongatis, a basi leviter attenuatis, ante apicem magis angustatis, apice acuminatis et paulo divaricatis, dorso grosse lineato-punctatis, suturam versus et postice leviter striatis, intervallis lævibus, transversim plicatulis; prosterno densissime punctato, rugosulo, metasterno sat grosse laxo, abdo-*



mine subtiliter densius punctato; ♂ tibiis posterioribus intus obsoletissime sinuatis. — San-Esteban.

Ressemble à *A. fastigiatum* Mäklin, mais plus grand, plus robuste, avec le corselet plus large et plus court, plus fortement ponctué, ayant en arrière une impression arquée, et les élytres pas plus larges que le corselet.

**Pœcilesthus vagelineatus.** — Long. 12 mill. — *Ovato-oblongus, postice leviter ampliatus, valde convexus, supra castaneo-rufescens, modice nitidus, vix ænescenti-micans, capite prothoraceque magis ænescentibus, elytris fusco-lineolatis; capite dense sat subtiliter punctato, medio longitudinaliter ac leviter sulcato, antennis fusco-cæruleis, articulis 4 primis nitidis, 5 ultimis paulatim latioribus; prothorace elytris angustiore, longitudine duplo latiore, lateribus fere rectis et parallelis, ante angulos anticos tantum rotundatis, haud sinuatis, margine postico fere recto, angulis rectis, anticis valde obtusis, dorso fere æquali, subtiliter punctulato, antice medio longitudinaliter sulcato, basi marginato et utrinque obsoletissime impresso; scutello acute ogivali, fere lævi, nitidior; elytris medio valde convexis, apice obtusis, punctato-lineatis, vix striatulis, intervallis planis, vix perspicue punctulatis; subtus obscurior, magis viridi-æneo tinctus; tibiis tarsisque viridi-æneis.* — San-Esteban.

Ressemble assez, pour la forme et la coloration générales, à *P. variipes* Champ., mais moins étroit, avec les antennes plus courtes, le corselet presque complètement uni, à bords latéraux entiers, parallèles, et les élytres plus élargies en arrière, moins arrondies à l'extrémité. Il se rapproche de *P. suturalis* Germ., mais la coloration est assez différente, les antennes sont moins longues et les lignes ponctuées des élytres sont plus marquées et plus écartées. Il paraît surtout ressembler à *P. laticornis* Mäkl., trouvé également à San-Esteban, mais ce dernier a les intervalles des élytres très finement et densément ponctués, sans lignes brunâtres, l'abdomen plus foncé, la tête largement canaliculée, sans teintes vertes, et le corselet aussi largement canaliculé, tandis que, chez notre espèce, il n'y a qu'un court sillon médian en avant avec une impression très obsolète de chaque côté de la base.

**STRONGYLUM CYANICORNE** Er., — Mäkl., Monog., 178. — Long. 14 à 16 mill.

La rencontre au Venezuela de cette espèce péruvienne est assez intéressante. La description s'applique bien à l'unique individu trouvé par M. E. Simon à San-Esteban; seulement, la taille est un peu plus forte, le corselet présente deux larges impressions. On peut ajouter qu'aux antennes ce sont les quatre premiers articles qui sont bleus et lisses, les

sept autres sont noirs, très ponctués et noirs, et qu'aux élytres les épipleures sont bleues et les intervalles des stries forment des côtes vers l'extrémité.

**Strongylium picicorne.** — Long. 10 à 11 mill. — *Elongatum, convexum, viridi-æneum, nitidum, antennis ferrugineo-brunneis, articulis 3 primis ænescentibus; capite sat dense punctato, inter oculos oblonge impresso; antennis sat gracilibus, articulis 4-10 apice sat angulatis, articulis 3<sup>o</sup> 4<sup>o</sup>que subæqualibus; prothorace elytris angustiore, longitudine fere duplo latiore, lateribus fere rectis, parallelis, ad angulos anticos oblique truncatis, dorso sat dense fortiter punctato, basi sat crasse marginato et polito; scutello triangulari; elytris elongatis, fortiter crenulato-striatis, striis magis viridibus intervallis sat fortiter convexis, lævibus, stria 5<sup>a</sup> longe ante apicem abbreviata; subtus subtilissime punctulatum, lateribus et præcipue prosterno evidentius; ♂ angustior, fere parallelus, oculis antice vix separatis.* — San-Esteban.

Assez voisin de *S. mediocre* Makl., mais les yeux sont plus rapprochés et les stries des élytres sont moins fortement ponctuées.

1. **Talanus parallelus.** — Long. 7 à 8 mill. — *Alatus linearis, parallelus, convexus, brunneo-castaneus, nitidus, femoribus interdum basi rufescenti-piceis; capite dense punctato, antice transversim fortiter impresso; antennis basi rufo-piceis, basin prothoracis paulo superantibus, articulis 5 ultimis latioribus et obscurioribus; prothorace elytris angustiore, longitudine paulo longiore postice leviter attenuato, lateribus vix sensim sinuatis, dorso dense sat fortiter punctato, basi transversim leviter depresso; elytris elongatis, lateribus marginatis punctato-substriatis, stria suturali profunda, apice obtuso; subtus lævis; ♂ tibiis omnibus paulo post medium intus denticulo minutissimo arcuatis.* — Caracas.

Cette espèce paraît se rapprocher de *T. columbianus* Mäkl., mais ce dernier est notablement plus petit, la coloration est plus rougeâtre et les stries des élytres sont à peine marquées sur le disque, tandis qu'ici elles sont égales, la suturale et la marginale étant profondes, les points diminuent vers l'extrémité; les caractères des mâles sont assez remarquables. *T. neotropiculis* Champ., qui paraît être voisin de notre espèce, est plus grand, à coloration plus bronzée, les articles 9 et 10 des antennes sont plus larges; le corselet présente, de chaque côté de la base, une faible impression oblique moins ponctuée, les quatre tibias antérieurs ont en dedans une dent triangulaire, les postérieurs en ont trois, dont une souvent obsolète, et rapprochées de l'extrémité; le dessous du corps est ponctué sur les côtés. *T. subexaratus* Makl., de la

Nouvelle-Grenade, diffère par le corselet rugueusement et inégalement ponctué, plus fortement que chez le *cribrarius*, tandis qu'ici la ponctuation est serrée, mais égale, et la surface est nettement impressionnée avant la base.

2. **Talanus crenulatus.** — Long. 4 à 6 mill. — *Præcedenti affinis, sed minor, brevior, minus parallelus, picco-fuscus, interdum piceus, nitidus; antennis basi rufo-piceis, articulis 4 ultimis paulo crassioribus; prothorace elytris angustiore, lateribus postice evidenter sinuato, angulis posticis fere acutis, dorso sat fortiter densissime punctato, basi minus punctato et transversim sat fortiter impresso; elytris ad humeros angulatis, postice levissime ampliatas, fortiter punctato striatis, striis crenatulis, punctis postice minoribus, stria suturali vix profundiore, intervallis convexiusculis, subtilissime punctatis; subtus lævis; ♂ tibiis omnibus ante apicem denticulo minuto acutiusculo armatis.* — San-Esteban.

Diffère du précédent par sa forme plus courte, moins parallèle, son corselet plus sinué sur les côtés; *T. columbianus* a les élytres bien moins striées, avec les stries finement ponctuées et à peine marquées sur le disque et le corselet est plus finement ponctué. *T. humilis* Mäkl. de Colombie, paraît bien voisin, mais les points des stries élytrales sont subarrondis, tandis qu'ici ils sont presque ovalaires, avec les intervalles distinctement ponctués et assez convexes.

**Lobopoda pilosula.** — Long. 14 mill. — *Elongata, postice attenuata, convexa, piceo-brunnea, sat longe fulco-griseo-villosa, modice nitida, subtus cum pedibus nitidior, subtiliter pubescens; capite subtiliter sat dense punctato, antennis sat elongatis, dimidium corporis fere attingentibus, articulis subæqualibus, ultimis vix brevioribus; prothorace elytris paulo angustiore, transverso, antice angustato, lateribus antice tantum cum angulis rotundatis, dorso sat dense punctato, basi utrinque breviter sinuato, medio linea late arcuata, subtiliter impressa et utrinque foreola terminata, angulis posticis acute rectis, disco medio linea obsolete impressa, basi latiore et profundiore; scutello vix punctulato, apice obtuso; elytris a basi postice attenuatis, fortiter punctato-striatis, punctis profunde impressis, intervallis modice convexis, subtiliter asperatis, pilis longis sat dense, et alternatim paulo densioribus; subtus punctata, prosterno antice et postice abrupto, pedibus subtiliter dense punctatis; ♂ angustior, postice valde attenuata, tarsis anticis articulis 4 primis subtus lobatis, intermediis 4° solo lobato, segmento ventrali ultimo medio plunato-impresso, oculis antice contiguus; ♀ latior, postice vix attenuata, tarsis articulo 4° solo et brevius lobato, segmento ventrali ultimo haud distincte impresso, oculis antice distantibus.* — San-Esteban.

Ressemble beaucoup à *L. velutina* Cast., du Brésil, mais plus petit, avec les angles postérieurs du corselet bien moins saillants et le bord postérieur moins fortement bisinué, les élytres plus fortement striées, les stries bien plus fortement ponctuées, les intervalles à villosité plus longue, paraissant alternativement plus serrée. Les points rendent les stries un peu crénelées, et sont séparés par un petit pli transversal lisse.

**Dietopsis acuminata.** — Long. 10 à 13 mill. — *Oblongo-elongata, postice attenuata, sat convexa, piceo-ænescens, nitida, pedibus, antennis et ore dilutioribus; capite subtiliter punctato, inter oculos obsolete striato, antice rufescente, antennis gracilibus, medium corporis paulo superantibus; prothorace elytris valde angustiore, parum transverso, a basi antice angustato, fortiter parum dense punctato, paulo inæquali, angulis posticis acutiusculis; scutello sat truncato, lævi; elytris postice angustatis et acuminatis, fortiter striato-crenatis, punctis basin versus majoribus, intervallis convexis, fere lævibus; subtus fere lævis, metapleuris punctatis, tarsis 4 anticis sat latis, articulis 2 penultimis fortiter lamellatis; ♂ major, attenuatus, antennis paulo longioribus, segmentis ventralibus 2 ultimis lateribus punctatis et impressis; ♀ minor, minus attenuata, abdomine latiore, elytris minus acuminatis.* — San-Esteban, Caracas.

Cette espèce est remarquable par la forte ponctuation du corselet et par l'extrémité des élytres acuminée chez le mâle, au lieu d'être obtuse ou tronquée comme chez les autres *Dietopsis*.

**1. Xystropus fascicularis.** — Long. 5 à 6 mill. — *Oblongus, sat convexus, fusco-æneus, nitidus, longe fusco-hirtus, capite prothoraceque subtiliter griseo-pubescentibus, elytris maculis numerosis minutis griseo-pubescentibus ornatis; capite prothoraceque dense punctatis, hoc brevi, elytris angustiore, lateribus antice rotundatis, basi sat fortiter sinuatis, angulis posticis acutis, anticis rotundatis; antennis fuscis aut piceis, crassis, basi paulo gracilioribus; scutello minuto, brevi, punctato; elytris ad humeros angulatim rotundatis, apice obtusis, irregulariter lineato-punctatis, punctis basi majoribus, lateribus et postice obsolescentibus, intervallis plagulis subtiliter et dense punctulatis impressis et granulis piliferis minutis seriatis; subtus cum pedibus picescens, punctatus, pubescens.* — Caracas.

Ressemble aux *X. fallax* et *pilosus* Mäkl., mais plus petit, avec le corselet bien moins large, plus fortement ponctué, les antennes sont plus courtes et les élytres ont des impressions très distinctes; la taille est aussi plus faible.

2. **Xystropus albovittatus.** — Long. 8 mill. — *Oblongo-ovatus, ellipticus, convexus, æneus, pilis griseis, in elytris seriatim dispositis vestitus; capite dense punctato, antice truncato, antennis fuscis (fractis), sat crassis, punctatis; prothorace transverso, elytris hand angustiore, lateribus rotundato, ciliato, antice paulo angustato, angulis anticis rotundatis, margine postico fere recto, angulis subrectis, dorso dense punctato; scutello dense piloso; elytris medio vix ampliatis, apice obtuse acuminatis, dorso aspero-punctatis, rugosulis, lineis pilosis densius ac tenuius punctatis; subtus rufescens, dense sat subtiliter coriaceus, dense griseo-pilosus.* — Coroza.

Cet Insecte ressemble extrêmement à *X. griseostriatus* Fairm., mais les stries sont bien plus larges, peu enfoncées, finement et très densément ponctuées, les intervalles sont plus unis, les bandes pubescentes sont plus larges, l'écusson n'est pas ponctué, le corselet n'a pas d'échancrure au milieu de la base, la taille est plus grande et la convexité moins forte au milieu des élytres.

Dans la collection Chevrolat, il existe un individu en assez mauvais état, portant le nom de *Epitragus lineatus* Chev., qui est bien identique avec *E. griseovittatus*; mais il était classé parmi les *Epitragus*, malgré les crochets pectinés, et je ne pensais guère à l'y rencontrer. Le faciès de ces espèces à bandes de pilosité blanche ou grise est assez différent des autres et la forme du corps est plus elliptique.

3. **Xystropus gossypiatus.** — Long. 4 1/2 à 5 mill. — *Ovato-oblongus, postice leviter ampliatus, sat convexus, æneus, nitidus, pilis gossypiatis albis, in elytris seriatim aut maculosis, nigro-hirtus; capite prothoraceque punctatis, illo antice transversim impresso, antennis crassiusculis, brevibus, nigro-fuscis, articulis 5 ultimis paulo crassioribus, dense punctatis, opacis; prothorace elytris paulo angustiore, brevi, lateribus rotundato et subtiliter denticulato, ciliato; scutello obtuso, grossypiato; elytris ovato-oblongis, apice obtusis, ad humeros sat angulatis, dorso parum regulariter asperulo punctatis, paulo rugosulis, vage lineatis; subtus cum pedibus albo-pilosus, pedibus piceis, tarsis obscurioribus.* — Caracas.

La femelle est un peu plus grande que le mâle et les bandes des élytres, au lieu d'être fines et régulières, sont formées de taches cotonneuses plus ou moins alignées.

Ressemble à *X. griseostriatus* Fairm., du Brésil, mais plus petit, moins convexe, les élytres n'ayant pas de stries distinctes.

4. **Statira Simonis.** — Long. 9 à 11 mill. — *Elongata, rufa,*



*nitida, elytris æneis; capite lævi, inter antennis transversim sat fortiter impresso, oculis magnis, antennis gracilibus, medium corporis haud attingentibus, articulis subæqualibus, 2° brevior excepto, ultimo tribus præcedentibus conjunctis fere longiore; prothorace longitudine haud latiore. lateribus sat rotundatis, basi sinuatis, angulis posterioribus extus acutis, basi recta, marginata. dorso densissime ac subtilissime punctulato; scutello ovato triangulari; elytris postice levissime ampliatis. apice obtuse acuminatis, subtiliter punctato-lineatis, basi substriatis, intervallis planis, 3° punctis grossis laxè impresso, stria 5<sup>a</sup> punctis 4 similibus et stria ante marginali postice 4 aut 5 punctis impressis; subtus lævis, tibiis punctulatis. — San-Esteban, Colonia Tovar.*

Paraît voisine de *S. Mäklini* Kirsch (Berl. Ent. Zeits., 1866, 205), mais cette dernière est d'un brun noir, et les intervalles sont un peu relevés avant l'extrémité.

2. *STATIRA CYLINDRICOLLIS* Mäkl., Statir, N. Granada, 361. — Long. 4 à 5 mill. — *Modice elongata, piceo-nigricans, nitida. ore antennisque a basi fere ad apicem usque dilutius rufescentibus; capite crebre et admodum profunde punctato; pronoto latitudine plus quam quarta parte longiore, magis quam in speciebus ceteris hujus generis cylindrico, longe ante medium sensim perparum rotundato-dilatato et deinde basin versus vix angustato, longe ante angulos basales levissime subsinuato, crebre et admodum profunde punctato; elytris a basi ad 2/3 partem totius longitudinis sensim perparum dilutatis, longe pone basin transversim evidenter depressis, punctato-striatis, striis paululum ante apicem desinentibus, punctis striarum admodum subtilibus, versus basin elytrorum evidentioribus, interstitiis inter strias admodum angustis, alternis 3°, 5°, 7° et 9° punctis nonnullis paulo majoribus et inter se admodum distantibus impressis. — Nouvelle-Grenade.*

Cette description convient bien à une série d'individus trouvés par M. E. Simon à Caracas et à San-Esteban. La longueur est assez variable, et, en outre, ces individus présentent, sur les élytres, quelques poils hérissés dont Mäklin ne parle pas et qui doivent, sans doute, tomber facilement.

3. *Statira variicollis*. — Long. 5 mill. — *Elongata, modice convexa, violascenti-nigra, valde nitida, pilis sat longis tenuibus laxè hirtula, prothorace interdum rufo; capite summo lævi, antice biimpressiusculo, inter oculos foveola minuta signato; antennis fuscis apicem versus crassioribus, articulo ultimo tribus præcedentibus conjunctis fere æquali; prothorace elytris dimidio angustiore, longitudine haud sensim latiore, postice paulo angustato, lateribus antice rotundatis, basi leviter sinuatis.*



dorso lævi, basi sat fortiter marginato et medio fovealato; elytris ad humeros angulatis, subtiliter substriato-punctatis, post scutellum transversim obselete impressis, intervallis fere planis, punctis piliferis distantibus impressis; subtus lævis. — Corozal.

Ressemble assez à la précédente, mais plus parallèle, plus allongée, avec la tête et le corselet lisse, ce dernier moins rétréci en avant; les élytres sont plus grossièrement ponctuées-striées, plus parallèles et moins convexes, surtout en arrière. Les antennes sont parfois ferrugineuses à l'extrémité.

**Bactrocera cribripennis.** — Long. 9 1/2 mill. — *Elongatus, convexus, brunneus, levissime metallescens, breviter griseo-pilosus, capite prothoraceque fere opacis, elytris nitidulis; capite subtiliter dense punctato-rugoso, basi transversim profunde sulcato, mandibulis valde nitidis, antennis sat gracilibus, basin prothoracis paulo superantibus, pilosulis, articulo 3° elongato, ultimo gracili, longo, præcedentibus 3 articulis conjunctis paulo longiore; prothorace ovali, elytris angustiore, antice angustato, rotundato et transversim sulcato, dorso subtiliter dense punctato-rugoso, basi marginato; elytris elongatis, parallelis, ad humeros rotundatim angulatis, apice obtuse rotundatis, dorso grosse ac dense punctatis, intervallis leviter transversim plicatulis.* — San-Esteban.

La forme du dernier article des antennes distingue le genre *Bactrocera* des *Eurygenius*; mais, pour le dernier article des palpes maxillaires, je le vois, chez cette nouvelle espèce, conformé comme chez les *Eurygenius*. Elle se distingue de *B. fasciculatus* Champ. par la forte ponctuation des élytres et leur pilosité uniforme.

**Macratia comosella.** — Long. 5 mill. — *Elongata, convexa, squalide castanescens, pilis adpressis pallide fulvis pilis longioribus erectis subseriatis immixtis vestita, ore, antennis femoribusque testaceo-fulvis; capite vertice summo breviter sulcato, oculis parum distantibus, antennis medium corporis haud attingentibus; prothorace ovato, elytris angustiore, antice capite haud angustiore, postice attenuato, dorso densissime sat subtiliter punctato, medio longitudinaliter obselete lineato, margine basali fere angulatim rotundato; scutello truncato; elytris fere parallelis, ad humeros angulatis, apice conjunctim rotundatis, dense sat subtiliter punctato-rugosulis, plagulis minutis lævibus paulo convexis seriatis; pectore dense griseo-sericante, abdomine magis rufescente, segmentis apice griseo-sericantibus, ultimo apice emarginato, femoribus*

*validis, clavatis, tibiis tarsisque griseo-sericantibus, his dilutioribus.* — San-Esteban.

Ressemble beaucoup à *M. tonkinea* Fairm., mais plus petite, plus finement rugueuse, avec les élytres marquées de petites taches brillantes, faiblement convexes, peu serrées, formant des séries qui déterminent des bandes de villosité.

**Mordellistena tenuis.** — Long. 3 1/2 mill. — *Elongata, postice leviter attenuata, fusca, parum nitida, subtiliter pubescens, subtus paulo nitidior et longius griseo-pubescens, pedibus antennisque concoloribus; capite convexo, lævi, antennis brevibus; prothorace brevi, transverso, elytris haud angustiore, antice haud sensim angustato, margine postico medio rotundatim lobato, angulis posticis rectis, dorso dense subtilissime vix perspicue punctulato; elytris sat elongatis, a basi leviter attenuatis, apice valde obtusis, indistincte punctulatis; subtus densius pubescens.* — Corozal.

Ressemble à *M. fuscipennis* Mels., de l'Amérique du Nord, mais plus atténuée en arrière avec le lobe médian du corselet plus arrondi, les angles postérieurs plus droits, les antennes plus courtes, les pattes et le corselet concolores.

**Rhipiphorus basicollis.** — Long. 5 mill. — *Oblongus, postice parum attenuatus, nigro-fuscus, nitidus, prothoracis vitta basali undulata cum propleuris prolongata, elytris macula discoidali abdominisque lateribus rufis; capite polito, antennis fuscis, opacis, articulo 1° rufo et 2° brunneo nitidis, ceteris longe flabellatis, articulis primis brevioribus; prothorace conica, basi medio late et triangulariter lobato, lobo apice obtuso, angulis posticis acute retroversis, dorso sat subtiliter sat dense punctato, punctis paulo aciculatis; elytris postice a medio leviter attenuatis, postice deliscentibus, apice paulo oblique truncatis, angulo suturali late rotundato, dorso subtiliter densissime strigoso-asperulo; subtus dense subtiliter asperulo-punctatus, pedibus fuscis, femoribus 2 posticis intus rufis.* — Caracas.

Voisin de *R. melanopterus* Chevr., mais plus grand, plus atténué en arrière, avec la tête et le corselet différemment colorés et la sculpture plus râpeuse.

Chez l'unique individu rapporté par M. E. Simon, l'une des élytres présente une tache rougeâtre, comme chez quelques *R. melanopterus*, tandis que l'autre est entièrement noire.

